



Idiopatinė plaučių fibrozė (IPF)

**Itin sunki, negrįžtamus pakitimus plaučiuose
sukelianti liga**


Pavojingesnė už daugelį
vėžio formų ¹



Vos 50% pacientų po
diagnozės išgyvena ilgiau
nei 2-5 metus ²



Svarbu žinoti




**Ankstyva diagnozė -
gyvybiškai svarbi**



**Laiku pradėtas gydymas
sulėtina ligos progresavimą
bei sumažina mirties riziką**

Sergant IPF plaučių
audinys randėja ir
kvėpuoti darosi vis
sunkiau ³



60% pacientų gydymas
pradedamas per vėlai ⁵

UŽDELSTA

50% atvejų IPF
neatpažįstama ⁴

IPF sudėtinga atpažinti

1. American Cancer Society, Cancer Facts & Figures 2010. Atlanta: American Cancer Society; 2010. Available from: <http://www.cancer.org/acs/groups/content/@nho/documents/document/acspc-024113.pdf>. Accessed: September 2015

2. Ley B, Ryerson CJ and Vittinghoff EA et al. Ann Intern Med 2012; 156: 684-691

3. NHS Choices. Pulmonary Fibrosis (idiopathic). Available from: <http://www.nhs.uk/conditions/pulmonary-fibrosis/Pages/Introduction.aspx>. Accessed: 21 April 2015

4. Collard H et al. Patient experiences with pulmonary fibrosis. Respir Med 2006, doi:10.1016/j.rmed.2006.10.002

5. Intermune, Esbriet® Global Demand Study- France, 2014, [data on file]

6. Cottin V. Eur Respir Rev 2014; 23:106-110