

2017 m. tarptautinio projekto We Care apklausos rezultatai

2017 m. "We Care" tarptautinio projekto, kurio metu apklausti 9629 dalyviai iš 6-ių Europos šalių ir Kanados, tikslas buvo įvertinti visuomenės žinias apie šlapimo pūslės vėžį ir nustatyti pagrindinius barjerus geresnei šlapimo pūslės vėžio diagnostikai ir gydymui.¹

Šlapimo pūslės vėžys yra vienas iš dažniausių vėžių pasaulyje, nuo kurio



65+ Vyresni vyrai turi didesnę tikimybę susirgti, bet gali sirgti visi nepriklausomai nuo amžiaus.²




Jeigu liga diagnozuojama vėlesnėse stadijose arba jau yra išplitusi už šlapimo pūslės ribų, išgyvenamumo dažnis siekia tik 5%.³



Nepaisant visko, visuomenės žinios apie šią ligą yra nedidelės.⁴

Šlapimo pūslės vėžio žinomumas



Beveik

1 iš 10

suaugusiųjų sako, kad niekada nėra girdėjęs apie šlapimo pūslės vėžį

Ligos požymių ir simptomų žinomumas



62%

suaugusiųjų sako, kad nežino šlapimo vėžio požymių ir simptomų

Dažniausi šlapimo pūslės vėžio simptomai yra šie:^{5,6}



Kraujas šlapime arba šlapimo spalvos pasikeitimas



Pilvo (skrandžio) skausmas




Apatinės nugaros dalies skausmas



Šlapimo pūslės dirginimas, staigus poreikis šlapintis

Asmeniškai patyrė šiai ligai būdingų simptomų

Iš apklausoje dalyvavusiųjų:



Beveik **1 iš 10** sako, kad yra buvę kraujo jų šlapime

Apytikriai **1 iš 5** sako, kad jiems yra skaudėję pilvą (skrandį) 3 mėn. ir daugiau

Daugiau nei **1 iš 4** sako, kad yra patyrę padažnėjusį šlapinimąsi 3 mėn. ir daugiau

Daugiau nei **1 iš 3** sako, kad jiems yra skaudėję nugarą 3 mėn. ir daugiau

Veiksmai pastebėjus simptomus

52%



žmonių, kuriems pasireiškė šlapimo pūslės vėžio simptomai, nėjo pas gydytoją, bet laukė kol tie simptomai išnyks

54%



žmonių nepasakytų šeimos nariams apie patirtus šlapimo pūslės vėžio simptomus, nes nenorėtų jų jaudinti

- Beveik du trečdaliai žmonių negali atpažinti šlapimo pūslės vėžio požymių ir simptomų
- Didžioji dalis žmonių, kurie pastebi šlapimo pūslės vėžio požymius ir simptomus, nesikreipia pas gydytoją
- Svarbu ypač tiems, kuriems yra didžiausia rizika susirgti (65+ amžiaus žmonėms, ypač vyrams ir rūkantiems), žinoti ir stebėti šlapimo pūslės vėžio simptomus ir požymius, kad liga būtų nustatyta anksti.⁶



1. The 2017 We Care survey was edited and distributed by Atomik Research, London, UK from the 6 - 23 January 2017.
 2. World Health Organization. GLOBOCAN 2012: Estimated cancer incidence, mortality and prevalence worldwide. Available at: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx Last accessed November 2016.
 3. National Cancer Institute. SEER Stat Fact Sheets: Bladder Cancer. Available at: <http://seer.cancer.gov/statfacts/html/urinb.html> Last accessed November 2016.
 4. Quale, DZ. Bladder Cancer Patient Advocacy: A Global Perspective. Bladder Cancer. 2015;1(2): 117-122. Available at: <https://bladdercancer.ca.org/images/uploads/pdf/bladdercancerpatientadvocacy.pdf> Last accessed March 2017.
 5. National Cancer Institute. Bladder Cancer Treatment (PDQ®)-Patient Version. Available at: <http://www.cancer.gov/types/bladder/patient/bladder-treatment-pdq> Last accessed March 2017.
 6. Patient. Bladder Cancer. Available at: <http://patient.info/health/bladder-cancer-leaflet> Last accessed November 2016.